



Universiteit  
Leiden

The Netherlands

## **Ultrasound studies in monochorionic twin pregnancies : results of TULIPS: Twins and ultrasound in pregnancy studies**

Sueters, M.

### **Citation**

Sueters, M. (2007, June 5). *Ultrasound studies in monochorionic twin pregnancies : results of TULIPS: Twins and ultrasound in pregnancy studies*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/12084>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/12084>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

# Stellingen

behorende bij het proefschrift

## Ultrasound studies in monochorionic twin pregnancies

Results of TULIPS:

### Twins and ULtrasound In Pregnancy Studies

1. Twee gescheiden placenta's in een tweelingzwangerschap zijn niet bewijzend voor dichorioniciteit.  
(dit proefschrift)
2. Tweeling Transfusie Syndroom kan al in het eerste trimester van de zwangerschap leiden tot foetale sterfte.  
(dit proefschrift)
3. Patiëntinstructies over de symptomen in combinatie met tweewekelijks echo-onderzoek ter beoordeling van de vruchtwatercompartimenten van beide foetussen is een veilig controlebeleid om Tweeling Transfusie Syndroom tijdig vast te stellen.  
(dit proefschrift)
4. Bij Tweeling Transfusie Syndroom kan cardiomegalie bij recipiënten zowel voor als na laserbehandeling optreden. Donoren ontwikkelen cardiomegalie enkel na behandeling.  
(dit proefschrift)
5. Bij patiënten die zwanger zijn van een monochoriale gemelli met abnormale, discordante echobeindingen en instemmen met karyotypering moet altijd een amniocentese van beide vruchtzakken verricht worden.  
(Lewi *et al.* Diagnosis and management of heterokaryotypic monochorionic twins. *Am J Med Genet* 2006;140:272-5)
6. Er is dringende behoefte aan een grote prospectieve en gerandomiseerde studie met lange termijn follow-up om antwoord te kunnen geven op de vraag wat het ideale tijdstip is voor de partus van een monochoriale tweeling.  
(Cleary-Goldman *et al.* Prospective risk of intrauterine death of monochorionic diamniotic twins. *Am J Obstet Gynecol* 2007;196:e11; author reply)
7. In de opleiding tot gynaecoloog dient een praktische stage echoscopie te worden opgenomen.
8. De kwaliteit van een ziekenhuis blijkt niet uit de plaats op een ranglijst, maar uit het feit dat de dokters zelf in hun eigen instelling behandeld willen worden.  
(vrij naar: Ben Crul, hoofdredacteur Medisch Contact)
9. Het voornaamste verschil tussen God en een arts is dat God niet denkt dat hij een arts is.  
(Bruno Sachs, huisarts/schrijver)
10. Een man moge veel weten: een vrouw begrijpt alles.  
(Gerard Reve, schrijver)
11. Zwangere vrouwen hebben meer plek om een carrière op hun buik te schrijven.
12. Het beste medicijn tegen rimpels is zelfontplooiing.