



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## **Determinants of vascular complications in type 2 diabetic South Asians**

Siezenga, M.A.

### **Citation**

Siezenga, M. A. (2011, September 27). *Determinants of vascular complications in type 2 diabetic South Asians*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/17876>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/17876>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

## Stellingen

behorende bij het proefschrift

### **Determinants of vascular complications in type 2 diabetic South Asians – focus on the complement system**

1. In vergelijking met Noord-Europese Caucasiërs hebben Surinaamse Hindoestanen hogere serum waarden van complement factor C3. (dit proefschrift)
2. In Surinaams-Hindoestaanse type 2 diabetes zijn serum waarden van Complement C3 niet voorspellend voor het optreden van cardiovasculaire of renale complicaties. (dit proefschrift)
3. Bij Surinaams-Hindoestaanse type 2 diabetes is een hoge SC5b-9 spiegel geassocieerd met nefropathie, maar niet met macrovasculaire complicaties. (dit proefschrift)
4. Properdine bevordert de complement-gemedieerde achteruitgang in nierfunctie bij proteinurische nierziekten. (dit proefschrift)
5. Centrale adipositas is een belangrijke pathofysiologische factor in het ontstaan van cardiovasculaire complicaties in Surinaams-Hindoestaanse type 2 diabetes. (dit proefschrift)
6. Hoewel in theorie de waist-to-hip ratio zowel door vermindering van buikvet als door toename van de heupomvang kan worden verlaagd, is in de praktijk alleen de eerste methode uitvoerbaar en medisch zinvol.
7. De associatie van Mannose-Bindend Lectine (MBL) met diabetesische nefropathie en coronaire hartziekten berust op verschillende pathofysiologische mechanismen.
8. In vergelijking met Noord-Europees Caucasische type 2 diabetes hebben Surinaams-Hindoestaanse type 2 diabetes een bijna 40 keer zo grote kans om aan de dialyse te geraken<sup>1</sup>, eenmaal aan de dialyse hebben zij echter een betere overleving dan Caucasiërs<sup>2</sup>  
(<sup>1</sup> Diabetologia 2002;45:337-341, <sup>2</sup> Nephrol Dial Transplant 2009;24:3774-3782)
9. Heden ten dage wordt dialyse ook aan tachtig-plussers aangeboden, waarbij velen van hen de naderende dialyse als een zwaard van Damocles boven hun hoofd zien hangen. Dit schaadt de kwaliteit van leven, terwijl velen van hen nooit aan dialyse toe zullen komen.
10. We zullen in de eeuwigheid zijn wat God in dit leven van ons heeft kunnen maken.
11. Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken. (Søren Kierkegaard)
12. Aangezien mensen na een bijna-dood ervaring méér oog hebben voor de natuur, beter kunnen relativeren en méér van klassieke muziek houden<sup>1</sup> zou de maatschappij er niet op achteruit gaan wanneer méér mensen een bijna-dood ervaring zouden hebben.  
(<sup>1</sup> P. van Lommel: “Eindeloos bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring”, ten Have, 2007)

M.A Siezenga  
September 2011

