

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/20854> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Waarde, Jeroen Antonius van

Title: Exciting matters in electroconvulsive therapy : studies on seizure thresholds

Issue Date: 2013-05-02

EXCITING MATTERS IN ELECTROCONVULSIVE THERAPY

STUDIES ON SEIZURE THRESHOLDS

1. Bij de meeste patiënten die worden behandeld met ECT, is de elektrische dosering therapeutisch als bij rechts unilateraal toegediende ECT de “vaste hoge dosis methode” en bij bilaterale behandeling de “halve leeftijdsmethode” wordt gebruikt. (dit proefschrift)
2. De elektrische dosis zou verhoogd moeten worden indien bilateraal behandelde patiënten tijdens de ECT kuur onvoldoende opknappen, al dan niet na het opnieuw vaststellen van de waarschijnlijk gestegen prikkeldrempel. (dit proefschrift)
3. Bij patiënten met een hogere prikkeldrempel kan er op een MRI scan van de hersenen sprake zijn van meer cerebrale atrofie en meer hersenvocht dan bij patiënten met een lagere prikkeldrempel. (dit proefschrift)
4. Bij patiënten met een psychotische depressie en bij patiënten die eerder succesvol met ECT werden behandeld, heeft het de voorkeur om de behandeling direct met ECT te starten, omdat verwacht kan worden dat ECT effectief zal zijn. (dit proefschrift)
5. Het is belangrijk om patiënten met een maligne vorm van katatonie (bijvoorbeeld een maligne neuroleptica syndroom) zo snel mogelijk te behandelen met dagelijkse ECT, totdat de autonome ontregeling onder controle is. (dit proefschrift)
6. De ziekenhuispsychiatrie heeft als belangrijke meerwaarde voor patiënten met acute psychiatrische problemen dat alle diagnostische en therapeutische mogelijkheden (24 uur per dag en 7 dagen per week) beschikbaar zijn.
7. Integrale gezondheidszorg betekent dat ieder groot regionaal ziekenhuis een klinische voorziening heeft waar (oudere) patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen en somatische comorbiditeit kunnen worden behandeld, waaronder met ECT.
8. Psychiatrische consultatie bij patiënten opgenomen in het algemene ziekenhuis is meestal niet eenmalig en vereist continuïteit. Daarom kan een arts in opleiding tot psychiater alleen maximaal van de verplichte stage consultatieve psychiatrie profiteren als deze meerdere dagen per week gedurende minimaal een half jaar wordt gevolgd, inclusief het verrichten van diensten buiten kantooruren.
9. De hedendaagse psychiatrie wordt nog steeds gehinderd door stigmatisering (het stigma op ECT is daar een extreem voorbeeld van), waarvan vooral patiënten en hun naasten de dupe zijn.
10. De inspanningen van het “zelf wetenschappelijk onderzoek doen” in een perifeer algemeen ziekenhuis zijn leerzaam, inspirerend, bevorderend voor de onderlinge samenwerking, en destigmatiserend voor de patiënt.
11. “Men vergeldt een leraar slecht als men altijd enkel de leerling blijft.” (Friedrich Nietzsche, 1882-1885. Uit: Aldus sprak Zarathoestra, Uitgeverij Boom; 2008)