



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Clinicopathologic and genetic features of primary cutaneous B-cell lymphoma

Hoefnagel, J.J.

Citation

Hoefnagel, J. J. (2007, January 11). *Clinicopathologic and genetic features of primary cutaneous B-cell lymphoma*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/8769>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/8769>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Stellingen

behorend bij het proefschrift

Clinicopathologic and genetic features of primary cutaneous B-cell lymphoma

1. De immunohistochemische expressie van Bcl-2, Bcl-6 en CD10 is een waardevol hulpmiddel bij de differentiaal diagnose van cutane B-cel lymfoproliferatieve aandoeningen. (dit proefschrift)
2. Gezien het indolente klinische beloop en de uitstekende prognose van het primair cutane marginale zone B-cel lymfoom, dient bij de behandeling een goede balans te worden gezocht tussen enerzijds dit gunstige beloop en anderzijds de kans op potentiële ernstige bijwerkingen van de ingestelde therapie. (dit proefschrift)
3. De verschillen in genexpressieprofielen tussen het primair cutane follikelcentrum lymfoom en het primair cutane grootcellige B-cel lymfoom, been type vormen een moleculair genetische ondersteuning voor het onderscheid tussen beide entiteiten en wijzen daarnaast op verschillende pathogenetische mechanismen. (dit proefschrift)
4. Inactivatie van het tumorsuppressorgen CDKN2A als gevolg van deletie of methylering is een veelbelovende prognostische parameter binnen de primair cutane grootcellige B-cel lymfomen, been type. (dit proefschrift)
5. Systemische therapie met fumaarzuuresters dient gezien zijn effectiviteit en gunstige bijwerkingenprofiel op de lange termijn beschouwd te worden als een waardevol therapeutisch middel bij ernstige psoriasis vulgaris.
6. “Skin diseases rarely end life, but they often ruin it.” (Department of Dermatology, Harvard Medical School, Boston)
7. De primair cutane CD30-positieve lymfoproliferatieve aandoeningen vormen bij uitstek een groep van ziekten waarbij de correlatie tussen het klinisch en histopathologisch beeld van onmisbaar belang is voor het stellen van de diagnose en het instellen van de juiste therapie.
8. Voor een goede relatie tussen arts en patiënt is het van cruciaal belang dat beiden begrijpen dat ook de geneeskunde niets aan het lot kan veranderen.
9. Terwijl 1 op de 5 patiënten vanwege een dermatologische klacht de huisarts bezoekt en meer dan twee miljoen Nederlanders met een huidziekte geregistreerd zijn, wordt tijdens de 6 jaar durende opleiding tot basisarts slechts enkele weken aan dit vak besteed. Het behoeft dan ook geen betoog dat er meer prioriteit gegeven zou moeten worden aan onderwijs en onderzoek op gebied van huidziekten.
10. Ervaring is iets dat je pas krijgt vlak nadat je het nodig hebt gehad.

11. "The urge to classify is a fundamental human instinct; like a predisposition to sin, it accompanies us into the world at birth and stays with us to the end." (AT Hopwood. Proceedings of the Linnen Society of London, 1957;171:230-234)
12. "Science is organized knowledge, wisdom is organized life." (Immanuel Kant)

Juliette Hoefnagel
Leiden, 11 januari 2007

