



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Fetoscopic interventions in complicated monochorionic twin pregnancies

Middeldorp, J.H.

Citation

Middeldorp, J. H. (2007, April 17). *Fetoscopic interventions in complicated monochorionic twin pregnancies*. Department of Obstetrics, Faculty of Medicine, Leiden University Medical Center (LUMC), Leiden University. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/11952>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/11952>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Stellingen

behorende bij het proefschrift

Fetoscopic interventions in complicated monochorionic twin pregnancies

1. Behandeling van het tweeling transfusie syndroom resulteert in significant hogere perinatale overleving wanneer deze plaatsvindt in een vroeger Quintero stadium.
(dit proefschrift)
2. Bij een volledig op de voorwand gelegen placenta biedt laparoscopisch geleide foetoscopie de mogelijkheid tot een veilige entree in de baarmoeder en optimale visualisatie voor lasercoagulatie van de vasculaire anastomosen bij tweeling transfusie syndroom.
(dit proefschrift)
3. In monoamniotische tweelingen, is occlusie en transsectie van de navelstreng met laser een technisch haalbare ingreep. In gevallen waar selectieve foetocide op deze wijze verricht is, kan een veilige vaginale bevalling plaatsvinden.
(dit proefschrift)
4. Ook wanneer een tweeling transfusie syndroom pas na een zwangerschapsduur van 26 weken wordt vastgesteld, is er na behandeling met laser minder vaak sprake van ernstige neonatale morbiditeit dan na behandeling met amniodrainage.
(dit proefschrift)
5. Bij het verlies van één van een tweeling tijdens de zwangerschap of rond de geboorte, is het belangrijk de ouders te blijven benaderen als ouders van een meerling, zowel rond de bevalling als de jaren erna.
(Bryan EM. The death of a twin. Pall Med 1995;9:187-192)
6. Bij de behandeling van een gecompliceerde tweelingzwangerschap mag de derde patiënt, de moeder, niet over het hoofd gezien worden.

7. In dealing with obstetric emergencies, it is important to train all members of the team to work effectively, as the system is only as strong as the weakest link.

(Black RS, Brocklehurst P. Systematic review of training in acute obstetric emergencies. BJOG 2003;110:837-41)

8. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

(Nelson Mandela)

9. Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

(Albert Einstein)

10. Als je aankomt, ben je op tijd.

(Frits, Overbridge Suriname 2007)

11. Wie snel wil gaan moet alleen gaan, wie ver wil komen moet met de groep gaan.

12. Het is de kunst in het leven niet alleen te doen wat je leuk vindt, maar ook leuk te vinden wat je doet.

Leiden, 17 april 2007

Annemieke Middeldorp