



Universiteit
Leiden

The Netherlands

The effect of statin therapy on vessel wall properties in type 2 diabetes without manifest cardiovascular disease

Beishuizen, E.D.

Citation

Beishuizen, E. D. (2008, December 4). *The effect of statin therapy on vessel wall properties in type 2 diabetes without manifest cardiovascular disease*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/13309>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/13309>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

THE EFFECT OF STATIN THERAPY ON VESSEL WALL PROPERTIES IN TYPE 2 DIABETES WITHOUT MANIFEST CARDIOVASCULAR DISEASE

1. Het nut van cardiale screening bij asymptomatische patiënten met diabetes mellitus type 2 is niet bewezen (dit proefschrift)
2. De gunstige effecten van laag gedoseerde statines in patiënten met diabetes mellitus type 2 zijn niet gerelateerd aan verbetering van de vaatwanddikte en endotheelfunctie (dit proefschrift)
3. In de richtlijnen voor primaire preventie van hart-en vaatziekten bij mensen met diabetes mellitus type 2 moet meer aandacht komen voor risico-stratificatie (dit proefschrift)
4. Het is niet duidelijk of verschillen in vaatwanddikte tussen patiënten van Hindoestaanse en Caucasische afkomst berusten op patiëntselectie danwel op daadwerkelijke ras-specifieke eigenschappen (dit proefschrift)
5. De kans op een recidief veneuze trombo-embolie na een eerste spontane veneuze trombo-embolie is bij mannen dermate hoog dat levenslange orale antistolling na het eerste event moet worden overwogen (CMAJ. 2008; 179: 417–426)
6. Bariatrische chirurgie bij kinderen zou alleen binnen studieverband mogen plaatsvinden (Prof.Dr.Y van der Graaf, NRC Handelsblad, juli 2008)
7. Het is onjuist om de toegevoegde waarde van een nieuwe risicofactor alleen te beoordelen door middel van ROC curves (Circulation 2007;115:928-935)
8. Een groot deel van de mensen met overgewicht is metabool gezond (Arch Intern Med. 2008;168: 1617-1624)
9. Gezien de relatie tussen het gebruik van protonpompremmers en het optreden van Clostridium difficile geassocieerde diarree bij gehospitaliseerde ouderen, dient de indicatie voor deze geneesmiddelen steeds kritisch te worden gezien (BMJ 2008;336:109)
10. Een bijzondere manifestatie van een veelvoorkomende aandoening komt vaker voor dan een typische manifestatie van een bijzondere aandoening (NTVG 2008; 152:2133-7)
11. Het beroep van arts is moeilijk te combineren met een huishouden (J.Beishuizen, 1984)

Edith D. Beishuizen
Leiden, 4 december 2008