



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

**Impact of age, tumor characteristics, and treatment on local control and disease outcome in early stage breast cancer : an EORTC translational research project**

Hage, J.A. van der

**Citation**

Hage, J. A. van der. (2006, May 22). *Impact of age, tumor characteristics, and treatment on local control and disease outcome in early stage breast cancer : an EORTC translational research project*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/4399>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4399>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

# Stellingen

behorende bij het proefschrift:

## **Impact of age, tumor characteristics, and treatment on local control and disease outcome in early stage breast cancer.**

### **An EORTC translational research project**

Neoadjuvant chemotherapie voor primair operabel mammacarcinoom biedt uitstekende resultaten wat betreft lange termijn prognose en biedt mogelijk voordelen wat betreft lokoregionale behandeling t.o.v. postoperatieve adjuvant therapie. .... (dit proefschrift)

Agressieve lokoregionale controle heeft in geselecteerde groepen wel degelijk impact op (ziekte vrije) overleving. .... (dit proefschrift)

Jonge vrouwen met borstkanker hebben meer baat bij agressieve lokoregionale therapie dan oudere vrouwen. .... (dit proefschrift)

Histologische gradering is een onafhankelijke prognostische factor bij jonge vrouwen met een primair operabel mammacarcinoom. .... (dit proefschrift)

Jonge leeftijd als absolute indicatie voor adjuvant systemische therapie bij primair operabel mammacarcinoom leidt tot overbehandeling. .... (dit proefschrift)

De chemosensitiviteit van hormoon receptor positieve tumoren is minder dan van hormoon receptor negatieve tumoren bij jonge vrouwen met primair operabel mammacarcinoom. .... (dit proefschrift)

Preoperatief echografisch onderzoek van de axilla verlaagt de kans op een positieve uitslag na schildwachtklier biopsie maar verlaagt ook de kans op een vals-negatieve uitslag bij patiënten met primair operabel mammacarcinoom. .... (de Kanter et al. Eur J Surg Oncol, 2006)

Evidence Based Medicine ontslaat de behandelend arts niet van de plicht zijn "boerenverstand" te gebruiken.

Poliklinische follow-up van borstkanker patiënten is zinvol en leidt tot eerdere ontdekking van potentieel curatief behandelbare lokoregionale recidieven. .... (de Bock et al. J Clin Oncol, 2004)

Het preoperatief bepalen van het CEA bij colorectale tumoren is prognostisch interessant maar heeft klinisch weinig consequenties.

"Fast-track" surgery: al is het ontslag nog zo snel, de complicatie achterhaalt haar wel.

De DBC denkt niet met u mee.

De opname ter observatie van kinderen met commotio cerebri is therapeutisch voor de commotie bij de ouders.

Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. .... (Albert Einstein)

J.A. van der Hage  
Leiden, 22 Mei 2006