



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Traces of language contact: The Flores-Lembata languages in eastern Indonesia

Fricke, H.L.A.

Citation

Fricke, H. L. A. (2019, November 13). *Traces of language contact: The Flores-Lembata languages in eastern Indonesia*. LOT dissertation series. LOT, Amsterdam. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/80399>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/80399>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/80399> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Fricke, H.L.A.

Title: Traces of language contact: The Flores-Lembata languages in eastern Indonesia

Issue Date: 2019-11-13

Nederlandse samenvatting

Het centrale doel van deze dissertatie is om de geschiedenis van de Flores-Lembatatalen te reconstrueren. Hierbij wordt ook gekeken naar taalverandering door taalcontact. De Flores-Lembatatalen vormen een subgroep van de Austronesische taalfamilie en worden gesproken in Oost-Indonesië.

Deel I van deze dissertatie vult de bestaande documentatie van de Flores-Lembatatalen aan door een beschrijvende grammatica van Centraal-Lembata te presenteren. Dit is de eerste uitgebreide beschrijving van een taal die behoort tot de Centraal-Lamaholotsubgroep van Flores-Lembata. Deel II behandelt de geschiedenis van zowel de fonologie als het lexicon van de Flores-Lembatatalen. Dit deel laat zien dat de Flores-Lembatatalen niet alleen geërfd Austronesisch vocabulaire bevatten, maar ook een niet-Austronesisch lexicaal substraat. Deel III onderzoekt morfosyntactische kenmerken en hun geschiedenis met betrekking tot taalcontact. Er worden acht kenmerken van de Flores-Lembatatalen beschreven die atypisch zijn voor Austronesische talen. Ook wordt geëvalueerd of het mogelijk is dat deze kenmerken voort zijn gekomen uit taalcontact met niet-Austronesische talen uit de regio.

Deze dissertatie toont aan dat de Flores-Lembatatalen genealogisch gezien nauw verwant zijn aan de Austronesische talen ten westen van Flores-Lembata. De Flores-Lembatatalen vormen samen met hun westerburen op Flores en andere Austronesische talen op de eilanden Sumba en Bima een subgroep op basis van innovatie (lenitie van Proto-Maleis-Polynesisch (PMP) *b > w). Het lexicon van de individuele Flores-Lembatataalgroepen bevat een aanzienlijk deel (tot wel 50% in afzonderlijke talen) dat niet herleid

kan worden tot een Austronesische voorouder. Dit vocabulaire is hoogstwaarschijnlijk geïntroduceerd onder invloed van taalcontact met niet-Austronesische talen die nu uitgestorven zijn.

Typologisch gezien, vooral waar het gaat om morfosyntaxis, zijn de Flores-Lembatatalen gemengd van aard. Naast geërfde Austronesische eigenschappen zijn er ook kenmerken die ze delen met hun oosterburen van de niet-Austronesische Timor-Alor-Pantarfamilie. In de Flores-Lembatatalen zijn er diverse morfosyntactische innovaties aan te wijzen die het gevolg zijn van taalcontact. Het nominale domein lijkt in dezen het meest beïnvloed te zijn. Enerzijds verschilt de woordvolgorde in de nominale constituent (NP) met die van typisch Austronesische talen; met name wat betreft de nominal bezitter, het telwoord en het locatieve naamwoord. Anderzijds zijn er nieuwe semantische categorieën gegrammaticaliseerd in een subset van de Flores-Lembatatalen: vervreemdbaar en onvervreemdbaar bezit wordt van elkaar onderscheiden, en het verschil tussen enkelvoud en meervoud wordt gemarkeerd op naamwoorden. Ook de syntaxis op zinsniveau heeft veranderingen ondergaan. In tegenstelling tot de geërfde situatie waarin de negatie aan het predicaat voorafgaat en het werkwoord tussen het subject en het object in staat (SVO-volgorde), hebben sommige Flores-Lembatatalen zinsfinale negatie ontwikkeld en hebben alle Flores-Lembatatalen een set van zinsfinale deictische werkwoorden van beweging gekregen. De woordvolgorde in de nominale constituent en twee van de deictische werkwoorden van beweging kunnen worden herleid tot Proto-Flores-Lembata. Alle andere innovaties lijken na de opsplitsing van Flores-Lembata plaatsgevonden te hebben. Al deze innovatieve kenmerken in de Flores-Lembatatalen zijn ook geattesteerd in de niet-Austronesische Alor-Pantartalen, die op twee aangrenzende eilanden in het oosten gesproken worden; deze kenmerken kunnen worden gereconstrueerd voor Proto-Alor-Pantar.

Op basis van een combinatie van lexicaal en typologisch bewijsmateriaal stel ik voor dat de Flores-Lembatatalen in contact moeten hebben gestaan met talen die typologisch gezien sterk lijken op de Alor-Pantartalen. Dit contact moet zowel voor als na de opsplitsing van Proto-Flores-Lembata plaats hebben gevonden. Sommige subgroepen van Flores-Lembatatalen hebben meer niet-Austronesische kenmerken verworven dan andere. Dit suggereert dat het taalcontact tussen de subgroepen varieerde in duur en intensiteit.