



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Basic and clinical features of cutaneous squamous cell carcinoma in organ transplant recipients

Genders, R.E.

Citation

Genders, R. E. (2019, November 21). *Basic and clinical features of cutaneous squamous cell carcinoma in organ transplant recipients*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/80760>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/80760>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/80760> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Genders, R.E.

Title: Basic and clinical features of cutaneous squamous cell carcinoma in organ transplant recipients

Issue Date: 2019-11-21

Basic and clinical features of cutaneous squamous cell carcinoma in organ transplant recipients

1. Een positieve serologische respons tegen Beta-PV antigenen rond de transplantatie voorspelt in orgaan transplantatie patiënten de latere ontwikkeling van cutane plaveiselcelcarcinomen. *(dit proefschrift)*
2. Immunohistochemische kleuring met p16 geeft een karakteristiek diffuus aankleuringspatroon van de epidermis bij de ziekte van Bowen. Bij andere (voorstadia van) keratinocyten carcinoom is dit patroon niet aanwezig. *(dit proefschrift)*
3. Bij orgaan transplantatie patiënten dient pijn als een belangrijk waarschuwingssignaal voor een invasief cutaan plaveiselcelcarcinoom. *(dit proefschrift)*
4. Bij orgaantransplantatie patiënten lijkt metastasering al op te treden bij kleinere plaveiselcelcarcinomen in vergelijking met immuuncompetente patiënten. *(dit proefschrift)*
5. Mohs' micrografische chirurgie heeft een weefsel sparend effect voor het primair sprieterig basaalceldcarcinoom. *(van Kester MS et al; J Am Acad Dermatol. 2019 80(6):1700-1703)*
6. Huidsurplus na excisie ("dog-ear") op de onderbenen hoeft niet gecorrigeerd te worden, aangezien dit vanzelf weer wegtrekt. *(Marsidi N et al, dermat Surg 2019)*
7. Mohs' micrografische chirurgie voor cutane plaveiselcelcarcinomen in het gelaat heeft een lager recidief percentage dan conventionele chirurgie. *(van Lee CB et al; Br J Dermatol. 2019;181(2):338-343)*
8. Er is geen indicatie voor schildwachtklieronderzoek bij het cutaan plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-hals gebied. *(Tejera-Vaquerizo A et al; J Dermatol. 2018;45(7):781-790)*
9. Men moet zich er bewust van zijn dat een biopt van een basaalceldcarcinoom niet altijd alle groeipatronen toont en dat een agressieve component kan worden gemist. *(Genders RE et al; J Am Acad Dermatol. 2016;74(4):758-760)*
10. Een stelling is een te bewijzen bewering en niet een al bewezen bewering.
11. Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van anderen. *(Albert Einstein, 1879-1955)*