



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## **Clinical and virological aspects of human parvovirus B19 Infection during Gestation.**

Haan, T.R. de

### **Citation**

Haan, T. R. de. (2007, November 13). *Clinical and virological aspects of human parvovirus B19 Infection during Gestation*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/12426>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/12426>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

# Stellingen

1. Het gebruik van de terminologie “*anemische* en *non-anemische*” hydrops foetalis levert een duidelijker en meer gestructureerde differentiaal diagnose op dan de eerder gebruikte termen “*immuun* en *non-immuun*” hydrops foetalis. *Dit proefschrift.*
2. Snelle diagnostiek bij verdenking van congenitale B19V infectie en vroegtijdige foetale behandeling voorkomen ernstige morbiditeit en mortaliteit bij het ongeboren kind. *Dit proefschrift*
3. Het beloop van een congenitale B19V infectie kan duidelijker in kaart worden gebracht door het combineren van kwantitatieve virale load bepalingen met serologische parameters. *Dit proefschrift*
4. De hoogte van de foetale B19V virale load correleert niet met de mate van foetale anemie of trombocytopenie. *Dit proefschrift*
5. Congenitale B19V infectie kan leiden tot ernstige trombocytopenie. Aangezien bloedingcomplicaties echter zelden worden waargenomen, staat het geven van trombocyten transfusie intra-uterien ter discussie. *Dit proefschrift*
6. Zelfs na een technisch geslaagde intra-uteriene transfusie ter correctie van foetale anemie en hydrops kan de lange termijn psychomotore ontwikkeling van aangedane kinderen vertraagd zijn. Ouders dienen hiervan op de hoogte te worden gesteld bij advies gesprekken. *Dit proefschrift*
7. De beste reflecties op het eigen functioneren worden verkregen tijdens het opleiden van jonge collega’s.
8. Beslissingen worden soms sterker bepaald door de samenstelling van een groep dan door daadwerkelijke argumenten.
9. Voor empathie en het geven van steun is een tolkentelefoon niet noodzakelijk.

10. Een nieuwe behandelingsmethode is pas relevant voor de praktijk indien er een aantoonbare verbetering optreedt in de lange termijn ontwikkeling van prematuur –of immatuur geboren kinderen.
11. “Some men have thousands of reasons why they cannot do what they want to, when all they need is one reason why they can.” Martha Graham. American dancer; teacher, choreographer of modern dance. 1894-1991.
12. “Never mistake motion for action.” Ernest Hemingway.