



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## **Epidural anaesthesia with levobupivacaine and ropivacaine : effects of age on the pharmacokinetics, neural blockade and haemodynamics**

Simon, M.J.G.

### **Citation**

Simon, M. J. G. (2006, May 11). *Epidural anaesthesia with levobupivacaine and ropivacaine : effects of age on the pharmacokinetics, neural blockade and haemodynamics*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/4384>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4384>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

# STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift

“Epidural Anaesthesia with Levobupivacaine and Ropivacaine: Effects of Age on the Pharmacokinetics, Neural blockade and Haemodynamics”

---

1. Na een enkele epidurale toediening van levobupivacaïne en ropivacaïne is de kans op systemische toxiciteit in ouderen niet verminderd. (dit proefschrift)
2. De daling van de gemiddelde arteriële bloeddruk na epidurale anesthesie is bij ouderen toe te schrijven aan een hoger niveau van analgesie en aan de leeftijdsafhankelijke veranderingen in het cardiovasculaire en het autonome zenuwstelsel. (dit proefschrift)
3. De epidurale toediening van een vaste hoeveelheid van een lokaal anestheticum leidt in oudere patiënten tot een hoger niveau van sympathische blokkade. Derhalve moet de dosis in deze patiënten worden verlaagd. (dit proefschrift)
4. Een farmacokinetisch/farmacodynamisch model van de epidurale ruimte kan een belangrijk instrument zijn in het onderzoek naar factoren die de kwaliteit van de analgesie beïnvloeden. (dit proefschrift)
5. Omwille van de mogelijke interacties van sedativa met andere middelen en de grote inter-individuele variabiliteit is er een belangrijke rol voor de anesthesioloog-pijnbestrijder weggelegd in het kader van palliatieve sedatie. (Richtlijn Palliatieve Sedatie, KNMG, december 2006)
6. Definiëring van nieuwe Spijswetten hebben op langere termijn mogelijk meer impact op de incidentie van overgewicht dan definiëring van het metabool syndroom en de marketing van rimonabant. (Prof. Dr. L. Fresco, Cleveringa-rede 2005)
7. Het voorschrijven van opiaten aan oudere patiënten voor de behandeling van matige tot ernstige chronische niet-maligne pijn leidt mogelijk tot verbetering van de kwaliteit van leven. (Auret K. and Schug SA, *Drugs Aging* 2005; **22**: 641-54)
8. De prijs van ‘normale’ verzorging van ouderen na een electieve of spoed heupoperatie kan worden terugverdiend door de profylactische toediening van een lage dosering haloperidol. (Kalisvaart *et al. JAGS* 2006; **53**: 1658-1666)
9. Het feit dat symmetrie in de kunst vaker als esthetisch wordt ervaren is vreemd gezien de asymmetrie die ten grondslag ligt aan het leven.
10. Ter verhoging van het kijkgenot gedurende het komende WK-voetbal pleit de gestage toename in lengte van de gemiddelde Nederlander voor vergroting en verhoging van de doelen met minstens 8 cm.
11. Vanwege het handschrift van de meeste artsen en de goede beschikbaarheid van computers en printers, zou een typecursus tot het basiscurriculum van een arts moeten behoren.
12. One pure chocolate egg a day, keeps the doctor away.