



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Raptors in changing West African savannas : the impact of anthropogenic land transformation on populations of Palearctic and Afrotropical raptors in northern Cameroon

Buij, R.

Citation

Buij, R. (2013, January 24). *Raptors in changing West African savannas : the impact of anthropogenic land transformation on populations of Palearctic and Afrotropical raptors in northern Cameroon*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/20446>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/20446>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/20446> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Buij, Ralph

Title: Raptors in changing West African savannas : the impact of anthropogenic land transformation on populations of Palearctic and Afrotropical raptors in northern Cameroon

Issue Date: 2013-01-24

Stellingen

behorende bij het proefschrift van Ralph Buij
Raptors in changing West African savannas

1. Zowel Afrikaanse als Palearctische roofvogels zijn vaak in staat zich te handhaven in sterk getransformeerde West Afrikaanse savannelandschappen, onder andere door flexibele foerageerstrategieën en omdat landschapsveranderingen soms samengaan met een toenemende beschikbaarheid van belangrijke prooipopulaties. (*dit proefschrift*)
2. Onderzoek naar de kwetsbaarheid van roofvogelgemeenschappen voor antropogene invloeden levert betere inzichten op als rekening wordt gehouden met inter- en intraspecifieke verschillen in lichaamsgrootte, en interspecifieke verschillen in mobiliteit. (*dit proefschrift*)
3. Habitatdegradatie kan leiden tot subtiele, onderbelichte effecten op vogels die negatieve gevolgen kunnen hebben voor voortplanting en overleving, zoals een beperking van de lichaamsconditie bij uitvliegen. (*dit proefschrift*, Appleby *et al.* 1997)
4. Door recente publicaties over een significante verarming van roofvogelpopulaties in West Afrikaanse savannes zou de illusie kunnen ontstaan dat investeringen in bescherming beter elders in Afrika besteed zijn– het tegendeel is waar. (*dit proefschrift*)
5. Het beschermen van apexpredatoren in Afrikaanse Nationale Parken is alleen effectief als bedreigingen op landschapsschaal – buiten de parken – kunnen worden gemitigeerd. Gezien het gebrek aan politieke wil en financiële middelen om de toenemende druk van een sterk groeiende bevolking te mitigeren is het uitsterven van apexpredatoren in de West Afrikaanse savanne zone zeer waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd.
6. De algemene indicatorrol van roofvogels voor hoge biodiversiteitswaarden zoals voorgesteld door Sergio *et al.* (2005) is contextafhankelijk en niet van toepassing op een deel van de roofvogelgemeenschap, zoals migrerende soorten buiten het broedseizoen.
7. De fixatie van Europese onderzoeksinstituten op de achteruitgang van Europese trekvogelsoorten leidt tot een buitenproportionele onderzoeksinvestering in West Afrika naar deze groep vogels, in vergelijking met de veel grotere groep Afrotropische vogelsoorten die veel kwetsbaarder is voor veranderingen in landgebruik in deze regio.
8. Studies die gebruik maken van satelliet telemetrie leveren interessante aanvullende inzichten op met betrekking tot habitatselectie en trekgedrag, vooral als protocollen voor analyse kunnen worden gestandaardiseerd, maar zijn geen adequate vervanging voor veldonderzoek.
9. Een vaak voorkomende, onjuiste interpretatie van *community conservation*, waarbij de nadruk ligt op privileges en nauwelijks op de verantwoordelijkheden van de lokale bevolking, kan het voortbestaan van bedreigde soorten in Nationale Parken en het bestaansrecht van die Nationale Parken in gevaar brengen.
10. De hoopvolle uitingen van natuurbeschermers op formele bijeenkomsten staan vaak haaks op hun werkelijke gedachten.