



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Sexual rehabilitation after treatment for gynaecological cancer

Bakker, R.M.

Citation

Bakker, R. M. (2017, May 16). *Sexual rehabilitation after treatment for gynaecological cancer*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/49750>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/49750>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/49750> holds various files of this Leiden University dissertation

Author: Bakker, R.M.

Title: Sexual rehabilitation after treatment for gynaecological cancer

Issue Date: 2017-05-16

“Sexual rehabilitation after treatment for gynaecological cancer”

Rinske M. Bakker

- [1] Problemen met het seksueel functioneren die vrouwen ervaren na behandeling voor gynaecologische kanker hangen zowel samen met lichamelijke, als psychosociale factoren [dit proefschrift HF 2 en 4]
- [2] Er is sterke behoefte aan praktische en bemoedigende informatie over seksualiteit na gynaecologische kanker [dit proefschrift HF 3, 5, 6, 7]
- [3] Sommige partners hebben net zoveel behoefte aan psychoseksuele nazorg als de gynaecologische kankerpatiënt zelf [dit proefschrift HF 3, 6, 7]
- [4] Door zenuwsparende radicale hysterectomie blijft de genitale opwindingsrespons, maar niet per definitie de subjectieve opwindingsrespons behouden [dit proefschrift HF 4]
- [5] Getrainde verpleegkundigen zijn de aangewezen zorgverleners om psychoseksuele nazorg te bieden aan gynaecologische kankerpatiënten [dit proefschrift HF 3, 7]
- [6] Langdurig en regelmatig vaginaal pelottegebruik na radiotherapie vergt, net als bij andere vormen van gedragsverandering, vooral volharding [dit proefschrift HF 6, Schwarzer, Lipke & Luszczynska (2011)]
- [7] Zowel bij een genitopelviene pijn/penetratiestoornis, als bij seksuele problemen na gynaecologische kanker speelt angst voor pijn een centrale rol [naar aanleiding van HF 2]
- [8] De meest geëmancipeerde gynaecologische kankerpatiënten krijgen momenteel de meest uitgebreide psychoseksuele nazorg [naar aanleiding van HF 3 & Vermeer, Bakker, Kenter, de Kroon, Stiggelbout & ter Kuile (2014)]
- [9] Hoe het seksueel functioneren van vrouwen die zijn behandeld voor gynaecologische kanker herstelt, is sterk afhankelijk van hun persoonlijke coping stijl [naar aanleiding van HF 2, 3, 6 & Bergmark, Avall-Lundqvist, Dickman, Henningsohn & Steineck (1999)]
- [10] Ziektevrij zijn is slechts een begin, want leven is meer dan overleven [naar aanleiding van interviews met patiënten]
- [11] Als we niet meer aandacht gaan besteden aan de positieve en plezierige aspecten van seksualiteit, lossen we de dalende seksuele activiteit onder de bevolking niet op [gebaseerd op uitspraken van de Zweedse minister van Volksgezondheid Wikström – Dagens Nyther 28 juli 2016]
- [12] Weinig psychologische experimenten zijn te repliceren, omdat de vaak kleine effecten onderhevig zijn aan subtiele contextuele veranderingen [naar aanleiding van uitspraken van professor van Lange van de Vrije Universiteit over de crisis in de psychologische wetenschap – Volkskrant 2 juli 2016]
- [13] Promoveren of de Kilimanjaro beklimmen: doorzettingsvermogen komt goed van pas [Tanzania – 2012]