



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Bilateral sagittal split osteotomy : risk factors for complications and predictability of the splitter-separator technique

Verweij, J.P.; Verweij J.P.

Citation

Verweij, J. P. (2017, September 12). *Bilateral sagittal split osteotomy : risk factors for complications and predictability of the splitter-separator technique*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/54689>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/54689>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/54689> holds various files of this Leiden University dissertation

Author: Verweij, Jop

Title: Bilateral sagittal split osteotomy : risk factors for complications and predictability of the splitter-separator technique

Date: 2017-09-12



STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

BILATERAL SAGITTAL SPLIT OSTEOTOMY

*Risk factors for complications and predictability
of the splitter-separator technique*

1. Het risico op permanente hypesthesie na een bilaterale sagittale slijtingsosteotomie neemt toe met de leeftijd van de patiënt (dit proefschrift).
2. De bilaterale sagittale slijtingsosteotomie met slijttang en slijthevels resulteert in patiënten van jonger dan 30 jaar in minder dan 8% permanente hypesthesie (dit proefschrift).
3. De sagittale slijtingstechniek met slijttang en slijthevels gaat niet gepaard met een hoger risico op bad splits dan klassieke technieken met beitels (dit proefschrift).
4. Verwijdering van schroeffixatie is aanzienlijk minder vaak geïndiceerd dan verwijdering van plaatfixatie na bilaterale sagittale slijtingsosteotomie (dit proefschrift).
5. Een botdefect van de onderrand van de mandibula na bilaterale sagittale slijtingsosteotomie komt vaker voor bij grote voorwaartse verplaatsingen, clockwise rotatie van het distale segment of een suboptimale positionering van het proximale segment (dit proefschrift).
6. De aanwezigheid van verstandskiezen tijdens de bilaterale sagittale slijtingsosteotomie geeft een kleine verhoging van het risico op bad split, maar heeft geen invloed op andere complicaties (dit proefschrift).
7. Het osteotomie-design en de geplande positie van de boorsneden tijdens een bilaterale sagittale slijtingsosteotomie zouden niet alleen chirurg-afhankelijk moeten zijn, maar ook patiënt-afhankelijk.
8. Een goede arts leert niet alleen de medische theorie en praktijk, maar ontwikkelt zich ook op het gebied van de menselijke, sociale en zakelijke kanten van de zorg.
9. Artsen denken met hun hoofd en tandartsen denken met hun handen, daarom kunnen beiden veel van elkaar leren.
10. Het onbekende is de grootste vijand en beste vriend van iedere ambitieuze onderzoeker.
11. Voor financiering van onderzoek geldt hetzelfde als Johan Crujff (1947-2016) zei over voetbal: "Ik heb nog nooit een zak geld een doelpunt zien maken."