



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Post operative radiation therapy in endometrial carcinoma : reducing overtreatment and improving quality of life

Nout, R.A.

Citation

Nout, R. A. (2013, April 17). *Post operative radiation therapy in endometrial carcinoma : reducing overtreatment and improving quality of life*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/20755>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/20755>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/20755> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Nout, Remi Abubakar

Title: Post operative radiation therapy in endometrial carcinoma : reducing overtreatment and improving quality of life

Issue Date: 2013-04-17

Stellingen

Behorende bij het proefschrift:

Post Operative Radiation Therapy in Endometrial Carcinoma *Reducing Overtreatment and Improving Quality of Life*

1. Brachytherapie is de adjuvante therapie van keuze voor patiënten met endometriumcarcinoom met risicofactoren. (dit proefschrift)
2. De kwaliteit van leven na vaginale brachytherapie van patiënten met endometriumcarcinoom is vergelijkbaar met een Nederlandse normpopulatie. (dit proefschrift)
3. Zelfs vijftien jaar na uitwendige radiotherapie van het bekkengebied heeft een kwart van de patiënten nog last van bestralingsgerelateerde darm- en/of blaasklachten. (dit proefschrift)
4. Er is geen verschil in seksueel functioneren tussen vrouwen die vaginale brachytherapie of uitwendige radiotherapie van het bekkengebied hebben ondergaan. (dit proefschrift)
5. Moleculaire prognostische factoren kunnen de indicatiestelling voor adjuvante behandeling van endometriumcarcinoom optimaliseren, en hiermee over- en onderbehandeling reduceren. (dit proefschrift)
6. Voor brachytherapie geldt: CTV = PTV.
7. Het adagium 'primum non nocere' en adjuvante therapie leven op gespannen voet met elkaar.
8. De introductie van beeldgestuurde brachytherapie voor het cervixcarcinoom heeft zowel geleid tot grote verbetering van de lokale controle als tot reductie van bijwerkingen.
9. Bestralingsgerelateerde bijwerkingen kunnen beter door de patiënt dan door de behandelaar worden gerapporteerd.
10. Men moet zich afvragen of genezing noodzakelijk is bij degene waarbij dat mogelijk is, en of genezing mogelijk is bij degene waarbij dat noodzakelijk is. (W. Whitmore)
11. Het brein is de belangrijkste spier bij het klimmen. (W. Güllich)

Remi A. Nout
Leiden, 3 februari 2013