



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## Malayic varieties of Kelantan and Terengganu: description and linguistic history

Wu, J.

### Citation

Wu, J. (2023, September 28). *Malayic varieties of Kelantan and Terengganu: description and linguistic history*. LOT dissertation series. LOT, Amsterdam. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3642470>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3642470>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

---

## Samenvatting in het Nederlands

---

Dit proefschrift bevat een synchrone beschrijving en een analyse van de historische ontwikkelingen van de Maleise variëteiten die gesproken worden in Kelantan en Terengganu, twee Maleisische staten aan de noordoostkust van het Maleisisch schiereiland. Drie verschillende variëteiten in het bijzonder worden onderzocht, namelijk Kelantan Maleis (KM), Terengganu Kust Maleis (CTM) en Terengganu Land Maleis (ITM). Ze behoren alle drie tot de Malayische subgroep van de Austronesische taalfamilie en worden ook wel de Noordoostelijk Schiereiland Malayische variëteiten (NEPMs) genoemd.

Hoofdstuk 1 biedt een overzicht van Maleise talen met meer gedetailleerde achtergrondinformatie over NEPMs, en van de geo-historische setting van het gebied waar deze talen gesproken worden. Het legt verder ook de methodologie en gegevensverzameling van deze studie uit. Het overige gedeelte van dit proefschrift bestaat uit twee delen. Deel één bestaat uit vijf hoofdstukken en geeft beschrijvende grammaticale schetsen van de NEPMs. Hoofdstukken 2 tot en met 4 richten zich op de fonologie van respectievelijk KM, CTM en ITM. Hoofdstukken 5 en 6 beschrijven de basale morfosyntaxis van NEPMs. Voortbouwend op de beschrijving in deel één, gaat deel twee in op de historische ontwikkelingen van NEPMs. Voortbouwend op de beschrijving in deel één, gaat deel twee in op de historische ontwikkeling van NEPMs. Hoofdstukken 7 en 8 trekken vergelijkingen tussen de NEPMs en de reeds bestaande reconstructies in hun gemeenschappelijke vooroudertaal, namelijk het Proto Malayisch, en ze onderzoeken de fonologie en morfologie vanuit historisch perspectief. Klankveranderingen en hun chronologische volgorde worden vastgesteld, en een bespreking volgt van de mo-

gelijke factoren die bijgedragen hebben tot de morfologische reductie die in deze talen waargenomen wordt. Hoofdstuk 9 dient als afsluitend hoofdstuk, waarin op basis van de linguïstische gegevens en historische documenten de migratiepatronen van de NEPM-sprekers worden afgeleid.

Elke NEPM variëteit heeft haar eigen fonologische systeem, maar onderling hebben ze veel gemeenschappelijke klankpatronen gemeen, met name in termen van lettergreep- en woordstructuur en in de verdeling van medeklinkers. Vooral de aanwezigheid van gegemineerde beginmedeklinkers is een opmerkelijke en typologisch ongebruikelijke eigenschap binnen de fonologie van de NEPMs, zowel in morfologisch eenvoudige als complexe vormen. De morfosyntactische aspecten van NEPMs vertonen ook significante overeenkomsten, die gekenmerkt worden door een grotendeels isolerend-analytisch profiel. Diachroon wordt de evolutie van NEPMs gekenmerkt door substantiële fonologische en morfologische reductie. Medeklinkers aan het einde van woorden zijn vaak samengevoegd en verloren gegaan en slechts een beperkt aantal voorvoegsels uit het Proto Malayisch is bewaard gebleven. Bovendien heeft oorspronkelijke prefigering plaatsgemaakt voor initiële geminatie, hetgeen een polyfunctioneel-morfofonologische operatie is. Hoewel sommige eerdere studies suggereren dat de morfologische reductie kan worden toegeschreven aan taalcontact, dit proefschrift betoogt dat interne fonologische veranderingen de primaire drijfveer zijn van de morfologische reductie. Bovendien vertonen NEPMs geen duidelijke sporen van substraatinvloed.

Van de drie NEPM-variëteiten belicht deze studie enerzijds de overeenkomsten tussen KM en CTM en anderzijds de distincte eigenschappen van ITM, die tot uiting komen in fonologie, morfologie en specifieke syntactische structuren. De gemeenschappelijke veranderingen die in de medeklinkersystemen van NEPMs worden waargenomen moeten ook verschillende ontwikkelingen in de klinkersystemen hebben gevolgd. Er wordt gesuggereerd dat ITM een aparte variëteit vertegenwoordigt, die verschilt van KM en CTM, en dat, ondanks hun onderlinge overeenkomsten, NEPMs geen aparte subgroep vormen binnen de Malayische talen. De huidige verspreiding en differentiatie van de NEPMs suggereren een migratiepatroon in twee golven. Er wordt verondersteld dat de voorouders van ITM-sprekers eerder aankwamen en zich vestigden in het binnenland van Terengganu, terwijl de voorouders van KM- en CTM-sprekers later arriveerden en zich voornamelijk langs de kustgebieden hebben verspreid.